



## Konsultacje – projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej (MZ1695)

Nasza uwaga dotyczy dodania 2 wskaźników do oceny jakości opieki zdrowotnej w zakresie obszaru klinicznego. Wskaźniki te dotyczą nacięć krocza oraz dokarmiania noworodków mieszanką mlekozastępczą.

V. opisywany przez struktury procedur medycznych wykonywanych w przypadku określonych problemów zdrowotnych

### 1. Badanie odsetka nacięć krocza

Nazwa: Współczynnik epizjotomii

Definicja: Odsetek porodów z wykonanym nacięciem krocza w liczbie wszystkich porodów samoistnych u danego świadczeniodawcy.

Uzasadnienie: Nacięcie krocza powinno być stosowane jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach. Pomimo tak jasnego stanowiska zawartego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, nadal funkcjonuje dużo mitów związanych z tą procedurą. Epizjotomia często stosowana jest jako uniknięcie pęknięcia krocza I lub II stopnia, które są fizjologiczne lub rutynowo u pierworódek. Wskaźnik nacięć krocza różni się w placówkach nawet o kilkadziesiąt punktów procentowych, stąd należy przywrócić się liczbom, by podejmować działania zmierzające do ograniczania tej poważnej ingerencji w naturalny przebieg porodu.

### 2. Badanie dokarmiania noworodków mieszanką mlekozastępczą

Nazwa: Współczynnik sztucznego dokarmiania noworodków

Definicja: Odsetek noworodków dokarmianych mieszanką mlekozastępczą podczas pobytu bezpośrednio po porodzie w łącznej liczbie urodzonych noworodków u danego świadczeniodawcy.

Uzasadnienie: Pierwsze dni po porodzie są kluczowe do udanego karmienia piersią przez matki. Istotne jest, jakie wsparcie otrzymują w szpitalu, jaka wiedza zostanie im przekazana, jakie będzie podejście personelu medycznego do pierwszych trudności laktacyjnych. Wskaźnik dokarmianych noworodków w różnych placówkach często różni się kilkadziesiąt punktów procentowych, dochodząc do 80% w niektórych szpitalach. Są to niepokojące liczby, które należy monitorować i podejmować działania ograniczające dokarmianie noworodków i zmierzające do promocji karmienia mlekiem kobiecym.